

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Enalapril Vitabalans 5 mg tabletės

Enalapril Vitabalans 10 mg tabletės

Enalapril Vitabalans 20 mg tabletės

Enalaprilio maleatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėliau gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės gydytojo arba vaistininko.
- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės gydytojo arba vaistininko. Žr. 4 skyrius.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Enalapril Vitabalans ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Enalapril Vitabalans
3. Kaip vartoti Enalapril Vitabalans
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Enalapril Vitabalans
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Enalapril Vitabalans ir kam jis vartojamas

Enalapril Vitabalans priklauso vaistams, vadinami angiotenziną konvertuojančiu fermentu (AKF) inhibitoriais, grupei. Šie vaistai plečia kraujagysles, todėl širdis lengviau jomis pumpuoja kraują visose kūno vietose, bei tokiu būdu sumažina padidėjusį kraujospūdį.

Enalapril Vitabalans vartojamas:

- didelio kraujospūdžio ligai (arterinei hipertenzijai) gydyti;
- simptominiams širdies nepakankamumui (būklė, kai širdis nepajėgia išstumti tiek kraujo, kiek jo reikia organams aprūpinti) gydyti;
- simptominio širdies nepakankamumo profilaktikai, kai simptomai dar nepasireiškia, tačiau širdies išsistimo funkcija yra sutrikusi.

2. Kas žinotina prieš vartojant Enalapril Vitabalans

Enalapril Vitabalans vartoti negalima:

- jeigu yra alergija veikliajai medžiagai enalaprilio maleatui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje) arba bet kuriam kitam AKF inhibitoriui;
- jeigu ankstesnio gydymo AKF inhibitoriais metu atsirado alerginė reakcija, vadinama angioneurozine edema, sukianti rankų, kulkišnių, veido, lūpų, liežuvio arba gerklės patinimą bei rijimo arba kvėpavimo pasunkėjimą;
- jei yra paveldimas arba savaiminis, t. y. nežinomos priežasties sukeltas, audinių patinimas (angioneurozinė edema);
- paskutiniuosius šešis mėnesius (taip pat Enalapril Vitabalans reikėtų vengti pirmus tris mėnesius – žr. skyrius "Nėštumas");
- jeigu Jūs sergate cukriniu diabetu arba Jūs inkstų veikla sutrikusi ir Jums skirtas kraujospūdį mažinantis vaistas, kurio sudėtyje yra aliskireno.

sp jimai ir atsargumo priemon

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš prad dami vartoti Enalapril Vitabalans

- jei J s ilgai ir sunkiai viduriavote arba v m te;
- jei vartojate šlapimo išsiskyrim skatinan i vaist , pvz., diuretik ;
- jei J s maiste labai ribojamas druskos kiekis;
- jei sergate kitomis širdies ir kraujagysli ligomis, pvz., koronarine širdies liga (kr tin s angina) arba širdies raumens liga, vadinama kardiomiopatija, yra sutrikusi smegen kraujotaka, pažeisti širdies vožtuvai, susiaur jusi aorta;
- jei yra inkst funkcijos sutrikimas, taikoma hemodializ arba yra persodintas inkstas;
- jei yra susiaur jusios inkst arterijos ir d l to pasireišk didelis kraujosp dis;
- jei sutrikusi kepen funkcija;
- jei sergate tam tikra jungiamojo audinio liga (kolagenoze), kuri apima ir kraujagysles, pvz., Reino (*Raynaud*) sindromas arba sklerodermija;
- jei anks iau pavartojus AKF inhibitori , prasid davo sausas nepalaujamas kosulys (žr. 4 skyri „Galimas šalutinis poveikis“);
- jei Jums reikalinga desensibilizacija, g lus vabzdžiams (pvz., bit ms ar vapsvoms);
- jei Jums taikoma MTL aferez (naudojant rang , valomas kraujas nuo per didelio cholesterolio kiekio);
- jei sergate cukriniu diabetu (žr. 2 skyriuje „Kiti vaistai ir Enalapril Vitabalans“);
- jei sergate jungiamojo audinio liga (kolagenoze), vartojate imunin sistem slopinan i preparat (autoimunin ms ligoms gydyti, pvz., reumatoidiniam artritui arba po transplantacijos operacijos), vartojate alopurinolio (podagrai gydyti) arba vartojate prokainamido (vaisto širdies ritmo sutrikimams gydyti);
- jei vartojate kalio drusk papild arba drusk pakaital , kuri sud tyje yra kalio;
- jei vartojate li io preparat (vartojam kai kurioms psichin ms ligoms gydyti);
- jei priklausote etninei grupei, kurios atstovams kraujosp d šis vaistas mažina nepakankamai (juodaodžiai pacientai);
- jeigu vartojate kur nors iš ši vaist padid jusiam kraujosp džiui gydyti:
 - angiotenzino II receptori blokatori (ARB) (vadinam j sartan , pavyzdžiui, valsartan , telmisartan , irbesartan), ypa jei turite su diabetu susijusi inkst sutrikim .
 - aliskiren

J s gydytojas gali reguliariai iširti J s inkst funkcij , kraujosp d ir elektrolit kiek (pvz., kalio) kraujyje.

Taip pat ži r kite informacij , pateikt poskyryje „Enalapril Vitabalans vartoti negalima“.

Pasakykite nedelsdami savo gydytojui, jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu atsiranda bet koks iš toliau nurodyt simptom :

- jau po pirmos doz s pasireiškia svaigulys. Kai kurie žmon s reaguoja pirm vaisto doz arba doz padidinus atsiranda svaigimas, silpnumas, alpimas ir šleikštulys;
- staigus veido, l p , liežuvio, tikrojo balso aparato, gerkl , kaklo bei rank ir p d patinimas, arba dusulys ar užkimimas. Ši b kl vadinama angioneurozine edema. Ji gali pasireikšti bet kokių vaisto vartojimo periodu. AKF inhibitoriais gydomiems juodaodžiams pacientams angioneurozin edema pasireiškia dažniau nei nejuodaodžiams;
- karš iavimas, gerkl s skausmas arba burnos gleivin s išop jimas (tai yra infekcin s ligos, pasireiškusios d l sumaž jusio balt j kraujo l steli skai iaus, simptomai);
- odos ir aki pageltimas (gelta), tai gali b ti kepen ligos požymiai.

Prieš pradedant vartoti Enalapril Vitabalans, pasakykite gydytojui, jei bet kuri min ta situacija jus neramina arba yra su Jumis susijusi.

Jei Jums planuojama atlikti operacij arba operuoti, taikant bendr j arba spinalin anestezij , pasakykite anesteziologui, kad vartojate Enalapril Vitabalans table i .

Jei manote, kad esate n š ia arba planuojate pastoti, b tinai apie tai pasakykite gydytojui.

Ankstyvuojų n štumo laikotarpiu Enalapril Vitabalans vartoti nerekomenduojama, o po trijų n štumo m nes i vartoti negalima, nes galimas sunkus vaisiaus pažeidimas (žr. skyri „N štumas“).

Kiti vaistai ir Enalapril Vitabalans

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitą vaistą, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Jeis gydytojas turi žinoti, jei vartojate vaistą, ypač toliau išvardytą:

-) diuretikai;
-) kalcio sulaikantys diuretikai, pvz., amilorido, spironolaktono arba triamtereno;
-) kalio papildymai, pvz., kalio tabletes arba kalio tirpalai;
-) kitoki vaistai nuo padidėjusio kraujospūdžio;
-) kitoki vaistiniai preparatai, kurie gali mažinti kraujospūdį, pvz., nitratai, vartojami koronarinei širdies ligai gydyti, tricikliniai antidepresantai (fenotiazino dariniai), vartojami psichikos ligai gydyti arba barbituratai, vartojami epilepsijai gydyti, migdomieji ar anestetikai;
-) litio (vaisto, vartojamo maniakinei depresijai gydyti);
-) vaistiniai preparatai nuo cukrinio diabeto (arba insulino, arba geriamieji antidiabetiniai preparatai). Gali prireikti mažinti dozes;
-) alopurinolio (vaisto nuo podagros) arba prokainamido (vaisto nuo širdies ritmo sutrikimo);
-) vaistiniai preparatai, slopinantys imuninę sistemą, pvz., po organų persodinimo;
-) nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), pvz., jei reguliariai arba ilgą laikotarpį vartojama acetilsalicilo rūgštis, ibuprofeno arba ketoprofeno. Nustatyta, kad mažos acetilsalicilo rūgštis paros dozės (50 arba 100 mg) vartojami kraujo krešėjimo profilaktikai, vartoti kartu su Enalapril Vitabalans yra saugu;
-) simpatikomimetikai (vaistai, sukeliančios kraujospūdžio padidėjimą);
-) aukso preparatai. Pacientams, vartojantiems aukso preparatus, gali pasireikšti veido paraudimas, pykinimas, vėmimas ir kraujospūdžio sumažėjimas.

Jeis gydytojui gali tekti pakeisti vaisto dozę ir (arba) imtis kitų atsargumo priemonių: jeigu vartojate angiotenzino II receptorių blokatorių (ARB) arba aliskireną (taip pat žiūrėti kitą informaciją, pateiktą poskyriuose „Enalapril Vitabalans vartoti negalima“ ir „spėjimai ir atsargumo priemonės“).

Enalapril Vitabalans vartojimas su maistu ir gėrimais

Maistas ir gėrimai neturi tokios Enalapril Vitabalans absorbcijai. Tabletes galima išgerti nevalgius arba valgio metu, užsigeriant pakankamu kiekiu (pvz., stikline) vandens.

Jeigu vartojama daug druskos (natrio chlorido), Enalapril Vitabalans poveikis silpnėja.

Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu vartoti druskos pakaitalą arba maisto papildymą, kuriuose yra kalio, nerekomenduojama, kadangi kraujyje gali labai padidėti kalio koncentracija.

Alkoholis gali stiprinti Enalapril Vitabalans poveikį kraujospūdžiui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Jeigu esate nėšia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėšia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Gydytojas patars nutraukti Enalapril Vitabalans vartojimą, jei planuojate nėštumą, jei esate nėšia arba Jums patars Enalapril Vitabalans pakeisti kitu vaistu, kadangi ankstyvuojant nėštumo laikotarpiu Enalapril Vitabalans vartoti nerekomenduojama. Jei vaisto vartojama po trijų nėštumo mėnesių, galimas sunkus pažeidimas kūdikiui.

Žindymo laikotarpis

Jeigu maitinate krūtimi ar planuojate tai daryti, apie tai pasakykite savo gydytojui. Vartojant Enalapril Vitabalans, pirmas kelias savaites po gimdymo yra nerekomenduojama maitinti krūtimi, ypač jei kūdikis gimė anksčiau laiko.

V liau gydytojas tur t patarti d l Enalapril Vitabalans vartojimo privalum ir tr kum , maitinimo kr timi metu, lyginant su kitais gydymo b dais.

Vairavimas ir mechanizm valdymas

Vairuojant automobil ar dirbant su mechanizmais reikia atkreipti d mes tai, kad retkar iais gali pasireikšti svaigulys arba nuovargis.

Enalapril Vitabalans sukelia šalutin poveik , susijus su kraujosp džio kritimu, pvz., svaigul , alpim arba kai kuriems pacientams miglot matym (žr. 4 skyri „Galimas šalutinis poveikis“). Tai ypa b dinga vaisto vartojimo pradžioje arba padidinus doz . Tokio poveikio galimyb mažesn , jei yra gera vaisto vartojimo kontrol . Jei pasireiškia toki simptom , reikia atsisakyti vairavimo ir kitos d mesio reikalaujan ios veiklos.

3. Kaip vartoti Enalapril Vitabalans

Visada vartokite š vaist tiksliai, kaip nurod gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkit s gydytoj arba vaistinink .

Tablet galima išgerti nevalgius arba valgio metu, užsigeriant pakankamu kiekiu (pvz., stikline) vandens.

Suaug žmon s

Didelio kraujosp džio liga

Paprastai pradin Enalapril Vitabalans paros doz yra nuo 5 mg iki ne didesn s, kaip 20 mg, prastin palaikomoji paros doz Z20 mg.

Širdies nepakankamumo gydymas

Pradin doz yra 2,5 mg per par . Gydytojas palaipsniui j didins tol, kol bus pasiekta tinkama doz . Paprastai palaikomoji paros doz yra 20 mg. J galima išgerti iš karto arba per du kartus.

Senyvi pacientai ir pacientai sergantys inkst nepakankamumu

Gydytojas nustato tinkam doz , atsižvelgdamas paciento inkst funkcijos paj gum .

Vartojimas vaikams

Gydytojas nustato tinkam doz , atsižvelgdamas paciento svor .

Jei manote, kad Enalapril Vitabalans poveikis yra per stiprus arba per silpnas, kreipkit s gydytoj arba vaistinink .

K daryti pavartojus per didel Enalapril Vitabalans doz

Jeigu pavartojote per didel medikamento doz , nedelsiant kreipkit s savo gydytoj , skubios pagalbos skyri arba artimiausi ligonin . Dažniausi perdozavimo simptomai ir požymiai yra staigus kraujo spaudimo kritimas ir stuporas (b sena, kai ligonis tampa visiškai nejudrus ir nekalbus, bet s mon išlieka). Kiti simptomai: d l staigaus kraujosp džio sumaž jimo atsirad s svaigulys arba apsvaigimas, stiprus ir greitas širdies plakimas, greitas pulsas, nerimas, kosulys, inkst nepakankamumas, ir dažnas kv pavimas.

Pamiršus pavartoti Enalapril Vitabalans

Negalima vartoti dvigubos doz s norint kompensuoti praleist doz . Kit tablet reikia išgerti at jus prastam vaisto vartojimo laikui.

Nustojus vartoti Enalapril Vitabalans

Nustojus vartoti medikamento, J s kraujo spaudimas gali padidėti. Jei J s kraujo spaudimas bus per didelis, galimas širdies ir inkstų funkcijos sutrikimas. Vaisto vartojimo nutraukti negalima, nebent J s gydytojas nurodys tai padaryti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Šalutinio poveikio požymiai nurodyti toliau.

Šalutinio poveikio dažnio apibūdinamas.

Labai dažni: pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 pacientų.

Dažni: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 10 pacientų, bet dažniau kaip 1 iš 100 pacientų.

Nedažni: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 100 pacientų, bet dažniau kaip 1 iš 1000 pacientų.

Reti: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 1000 pacientų, bet dažniau kaip 1 iš 10000 pacientų.

Labai reti: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 10000 pacientų, dažnis nežinomas (negalima būti vertintas pagal turimus duomenis).

Labai dažni (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 pacientų)

-) Miglotas matymas;
-) svaigimas, silpnumas;
-) sausas kosulys (jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu atsiranda nuolatinis kosulys, kreipkitės gydytoją);
-) pykinimas.

Dažni (pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 100 pacientų)

-) Galvos skausmas, depresija, nuovargis;
-) staigus kraujospūdžio sumažėjimas, keičiantis kuo padidėjęs, t. y. atsistojant iš gulimos padėties (pasireiškia svaigulys arba alpulys);
-) krūtinės skausmas, širdies ritmo sutrikimas, greitas širdies plakimas (tachikardija);
-) dusulys;
-) viduriavimas, pilvo skausmas, skonio pokyčiai;
-) išbėrimas arba kitokios alerginės reakcijos (žr. toliau „Angioneurozinė edema“);
-) kraujo serume padidėjęs kalio bei kreatinino koncentracija.

Nedažni (pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 1000 pacientų)

-) Anemija;
-) Cukriniu diabetu sergančių žmonių kraujyje per daug sumažėjusi cukraus koncentracija (hipoglikemija);
-) sumišimas, nervingumas, pojūčių sutrikimas, pvz., jaučiamas odos tirpimas, dilgs jimas (parestezija), galvos sukimasis, mieguistumas, nemiga;
-) stipraus širdies plakimo pojūtis (palpitacija);
-) sloga (rinitas), gerklės skausmas, užkimimas, kvėpavimo takų susiaurėjimas;
-) spengimas ausyse;
-) burnos sausumas, vėmimas, rėmuo, skrandžio dirginimas, vidurių užkietėjimas, svorio kritimas;
-) skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa, žarnų nepraeinamumas arba kasos uždegimas (pankreatitas), kurie pasireiškia pilvo skausmu;
-) gausus prakaitavimas, niežulys, dilgėlinė, plaukų slinkimas, odos paraudimas;
-) inkstų funkcijos sutrikimas, šlapime atsiranda baltymo;
-) impotencija;
-) raumenų spazmai, bloga savijauta, karščiavimas (žr. toliau „Dėl neiškištos priėmimo prasidėjus karščiavimas“).

Reti (pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 10000 pacient)

-) baltųjų kraujo ląstelių kiekio kraujyje sumažėjimas (žr. toliau „Dėl neiškišimo priešais prasidėjus karščiavimams“);
-) kraujo plokštelės kiekio sumažėjimas (dėl to atsiranda kraujavimas iš nosies arba mlynų atsiradimo tendencija);
-) limfmazgių padidėjimas, staigus autoimuninių ligų atsiradimas;
-) nenormalūs sapnai, miego sutrikimas;
-) Reino (*Raynaud*) sindromo pasunkėjimas (atsiranda rankų ir kojų pirštų skausmas, pirmiausiai į oda tampa blyški, po to melsva ir galiausiai rausva);
-) infiltratai plaučiuose, alerginis alveolitas, eozinofilinė pneumonija;
-) stomatitas (burnos gleivinės uždegimas), burnos gleivinės aftiškumas, liežuvio uždegimas;
-) kepenų funkcijos sutrikimas, hepatitas, tulžies takų obstrukcija (nepraeinamumas) su gelta (pagelsta oda ir akių baltymai);
-) sunki odos ir gleivinių reakcija (daugiaformė eritema, Stivenso-Džonsono (*Stevens-Johnson*) sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, pūslelinė, eritrodermija);
-) karščiavimas, raumenų arba kraujagyslių membranų uždegimas raumenų ir sąnarių skausmas (žr. toliau „Dėl neiškišimo priešais prasidėjus karščiavimams“)
-) sumažėjus šlapimo kiekis;
-) vyrų padidėjęs kraujavimas;
-) padidėjęs kepenų fermentų arba serumo bilirubino aktyvumas.

Labai reti (pasireiškia mažiau nei 1 vartotojui iš 10 000)

-) žarnų sienelių patinimas (žarnų angioedema)

Dažnis nežinomas (negalima vertinti pagal turimus duomenis)

-) netinkamos antidiurezinio hormono sekrecijos sindromas (ang. SIADH)

Angioneurozinis edema

Jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu atsirado rankų, pėdų, veido, liežuvio arba gerklų patinimas, galintis sukelti dusulį arba apsunkinti rijimą, Jūs nedelsiant turite kreiptis į gydytoją.

Dėl neiškišimo priešais prasidėjus karščiavimams

Jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu dėl neiškišimo priešais prasidėjo karščiavimas ir kartu pasireiškė gripo panašūs simptomai (pvz., gerklų skausmas), kreipkitės į gydytoją.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jei pasireiškė šalutinis poveikis, skaitant šiame lapelyje nenurodytą pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu <http://www.vvkt.lt>). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Enalaptil Vitabalans

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Ant d žut s ir lizdin s plokštel s po „EXP“ arba „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutin s nurodyto m nesio dienos.

Vaist negalima išmesti kanalizacij arba su buitini mis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemon s pad s apsaugoti aplink .

6. Pakuot s turinys ir kita informacija

Enalapril Vitabalans sud tis

- Veiklioji medžiaga yra enalaprilio maleatas. Vienoje tablet je yra 5 mg, 10 mg arba 20 mg enalaprilio maleato.
- Pagalbin s medžiagos yra pregelifikuotas krakmolos, kalcio-vandenilio fosfatas dihidratas, talkas, magnio stearatas, mikrokristalin celiulioz , povidonas, natrio-vandenilio karbonatas.

Enalapril Vitabalans 10 mg. Šiose tablet se yra pagalbin s dažo medžiagos - raudonojo geležies oksido (E172).

Enalapril Vitabalans 20 mg. Šiose tablet se yra pagalbin s dažo medžiag - raudonojo geležies oksido (E172) ir geltonojo geležies oksido (E 172).

Enalapril Vitabalans išvaizda ir kiekis pakuot je

Enalapril Vitabalans išvaizda:

Enalapril Vitabalans 5 mg tablet s. Tablet s yra 8 mm skersmens, baltos, apvalios, plokš ios, vienoje pus je yra vagel , skirta tabletei perlaužti.

Enalapril Vitabalans 10 mg tablet s. Tablet s yra 8 mm skersmens, rausvai rudos, apvalios, plokš ios, vienoje pus je yra vagel , skirta tabletei perlaužti.

Enalapril Vitabalans 20 mg tablet s. Tablet s yra 8 mm skersmens, šviesiai oranžin s, apvalios, plokš ios, vienoje pus je yra vagel , skirta tabletei perlaužti.

Tablet galima padalyti lygias dozes.

Pakuot s dydžiai:

28, 30, 56, 60, 98 arba 100 table i .

Gali b ti tiekiamos ne vis dydži pakuot s.

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Suomija

Tel. + 358 (3) 615 600

Faksas: + 358 (3) 6183 130

Gamintojas

Vitabalans Oy

Varastokatu 7-9

13500 Hämeenlinna

Suomija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės vietinį registruotojų atstovą.

UAB Vitabalans
Savanorių pr. 292 B
49454 Kaunas
Tel. 8-37 714 392

Šis vaistas EEE valstybėse yra registruotas tokiais pavadinimais: Enalapril Vitabalans
(Suomija, Švedija, Vokietija, Lenkija, Švedija, Slovėnija, Slovakija, Danija, Estija, Latvija, Lietuva,
Vengrija).

Šis pakuotimo lapelis paskutiną kartą peržiūrėtas 2016-03-31.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>