

PARAMAX Rapid 1 g tablety

paracetamolium

P e t te si pozorn celou p íbalovou informaci d íve, než za nete tento p ípravek užívat, protože obsahuje pro Vás d ležitý údaje.

- Ponechte si p íbalovou informaci pro p ípad, že si ji budete pot ebovat p e íst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého léka e nebo lékárníka.
- Tento p ípravek byl p edepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osob . Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné p íznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích ú ink , sd lte to svému léka i nebo lékárníkovi. Stejn postupujte v p ípad jakýchkoli nežádoucích ú ink , které nejsou uvedeny v této p íbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této p íbalové informaci

1. Co je PARAMAX Rapid 1 g a k emu se používá
2. emu musíte v novat pozornost, než za nete PARAMAX Rapid 1 g užívat
3. Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá
4. Možné nežádoucí ú inky
5. Jak p ípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je PARAMAX Rapid 1 g a k emu se používá

P ípravek PARAMAX Rapid 1 g pat í mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Lé ivou látkou p ípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1 g tlumí bolest a snižuje hore ku.

PARAMAX Rapid 1 g se užívá k lé b bolestivých stav , jako jsou bolesti hlavy v etn migrény, bolesti zad, zub , bolestivá menstruace a dále ke snížení hore ky.

PARAMAX Rapid 1 g též p ínází úlevu p i bolesti sval a kloub a bolesti v krku provázející ch ípku a nachlazení.

PARAMAX Rapid 1 g se rovn ž užívá k potla ení bolesti provázející n která revmatická onemocn ní jako je osteoartróza a p i neuralgii (silné bolesti poci ované v pr b hu nervu).

Vzhledem k obsahu lé ivé látky je p ípravek vhodný pro dospívající starší 15 let a dosp lé.

2. emu musíte v novat pozornost, než za nete PARAMAX Rapid 1 g užívat

Neužívejte p ípravek PARAMAX Rapid 1g:

- jestliže jste p ecitliv lý(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto p ípravku (uvedenou v bod 6)
- pokud trpíte závažným jaterním onemocn ním, žloutenkou
- jestliže trpíte závažnou hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti)

Upozorn ní a opat ení

Zvláštní opatření při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí:

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léky obsahující paracetamol.

Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař.

Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabírající srážení krve) a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.

Pacienti s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Další léky u přípravky a PARAMAX Rapid 1 g

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře zejména pokud užíváte:

- warfarin (lék snižující krevní srážlivost),
- metoklopramid, domperidon, probenecid (k léčbě nevolnosti a zvracení),
- rifampicin, chloramfenikol (antibiotika),
- kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
- probenecid (k léčbě dnů),
- fenobarbital, fenytoin, lamotrigin (k léčbě epilepsie),
- zidovudin (k léčbě HIV),
- isoniazid (k léčbě tuberkulózy),
- karbamazepin (k léčbě epilepsie a bipolární poruchy),
- cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
- jiné léky obsahující paracetamol.

PARAMAX Rapid 1 g s jídlem a pitím

Během užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem. V případě užívání během těhotenství je nutné použít co nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu a při co nejmenší četnosti opakování dávek.

V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Údržba dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku PARAMAX Rapid 1 g je ovlivněná pozornost při údržbě a obsluze strojů nepravděpodobné.

3. Jak se PARAMAX Rapid 1 g užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospívajících od 15 let a dospělých:

Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500 mg-1000 mg) podle potřeby 1-4krát denně. Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s tělesnou hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s tělesnou hmotností do 60 kg je vhodná jednotlivá dávka 1/2 tablety tj. 500 mg paracetamolu.

časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících.

Maximální denní dávka je 4g paracetamolu tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g.

Neprekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám dávkování přípravku PARAMAX Rapid 1 g upraví.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a):

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte **neprodleně** svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety vezměte sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užíjte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen vzácně.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

- mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení),
- zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)

- alergická kožní reakce ve formě zarudnutí pokožky až kopřivky,
- poruchy krvetvorby (snížení počtu krevních destiček a/nebo bílých krvinek), které obvykle vymizí po přerušení užívání přípravku,
- snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anémie),
- bronchospasmus (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktický šok (těžká alergická reakce),
- závažné kožní reakce,
- poškození jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, obalu na tablety a krabici za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje

Léčivou látkou je paracetamol 1 g v jedné tabletě

Pomocnými látkami jsou: Povidon, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení

PARAMAX Rapid 1 G jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety s příčnou rýhou na obou stranách tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletů lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení:

30 a 100 tablet

Tablety jsou zabaleny v blistru nebo v obalu na tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko

Výrobce

Vitabalans OY

Varastokatu 7-9

Hämeenlinna

13500
Finsko

Tato písemná informace byla naposledy schválena
15.3.2017

Další informace o tomto pípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vitalans CZ, s.r.o.
Na sádce 446/2
14 900 Praha 4
Česká republika