

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

IBUMAX 400 mg pl. veid. dengtos tabletės Ibuprofenas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėliau gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės vaistininko.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės gydytojo arba vaistininko. Žr. 4 skyrių.
- Jeigu per 3 dienas Jūs savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės gydytojo.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra IBUMAX ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant IBUMAX
3. Kaip vartoti IBUMAX
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti IBUMAX
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra IBUMAX ir kam jis vartojamas

IBUMAX pl. veid. dengtos tabletės sudėtyje yra veikliosios medžiagos ibuprofeno, priklausančio vadinamajam nesteroidiniam vaistų nuo uždegimo grupei. Vienoje IBUMAX pl. veid. dengtoje tabletėje yra 400 mg veikliosios medžiagos ibuprofeno. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą. IBUMAX vartojamas trumpalaikio silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip mėsini, galvos, dantų, raumenų, sėnari malšinimui. Karščiavimo mažinimui.

2. Kas žinotina prieš vartojant IBUMAX

IBUMAX vartoti negalima:

- jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardintos 6 skyriuje);
- jeigu praėityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, (NVNU) skaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius;
- jeigu yra sunkus kepenų funkcijos nepakankamumas;
- jeigu yra sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas;
- jeigu yra sunkus širdies funkcijos nepakankamumas;
- paskutini tris mėnesius laukotarpį;
- jeigu yra esama ar buvusi pepsinopa;
- jeigu yra buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu;
- jeigu yra kraujavimas smegenis, virškinimo traktu arba kitoks kraujavimas;
- jeigu yra sisteminė raudonoji vilkligė;
- jaunesniems kaip 12 metų vaikams.

spėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradami vartoti IBUMAX.

Nepageidaujamas poveikis gali sumažinti, vartojant mažiausi veiksming vaisto dozę trumpiausiu laikotarpiu, būtina simptomų kontrolei.

Poveikis širdies kraujagyslėms bei galvos smegenų kraujagyslėms

Tokie skausmą malšinantys ir uždegimą slopinantys vaistai, kaip ibuprofenas, ypač vartojami didelėmis dozėmis, gali būti susiję su nedideliu širdies priepuolio arba insulto rizikos padidėjimu. Neviršykite rekomenduojamos dozės ir gydymo trukmės.

Prieš pradėdami vartoti IBUMAX dėl gydymo pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu:

- Jums pasireiškia širdies problemos, skaitant širdies nepakankamumą, krūtinės anginą (jau iate skausmą krūtinėje) arba jeigu jums buvo širdies priepuolis, atlikta širdies kraujagyslių jungimo suformavimo operacija, diagnozuota periferinė arterijų liga (prasta kraujotaka padoje dėl susiaurėjusių ar užsikimšusių arterijų) arba buvo išties bet kokios rūšies insultas (skaitant mini insultą arba praeinant smegenų išemijos priepuolį (PSIP));
- Jūs kraujospūdis yra padidėjęs, sergate cukriniu diabetu, nustatytas didelis cholesterolio kiekis, buvo širdies liga sirgusių giminaičių arba giminaičių, kuriuos ištyko insultas, arba jeigu rėkote.

Dėl aseptinio meningito pavojaus, ligoniai, sergantys sistemine raudonąja vilklige ir jungiamojo audinio ligomis, prieš vartodami IBUMAX turėtų pasitarti su savo gydytoju.

Virškinimo trakto sutrikimai ir lėtinis uždegiminis žarnyno ligos gali pablogėti (opinis kolitas, Krono liga).

Jeigu yra inkstų pakenkimai ar inkstų funkcijos pablogėjimas.

Jeigu yra kepenų funkcijos sutrikimai.

Pacientams sirgusiems praeityje ar sergantiems bronchine astma ar alerginėmis ligomis gali išsivystyti broncho spazmas.

Vartojant ibuprofeną gali išsivystyti astmos priepuolis, ypač asmenims, kurie yra jautrūs acetilsalicilo rūgšties ar NVNU.

Reikia vengti vartoti ibuprofeną kartu su kitais NVNU, skaitant selektyvius ciklooksigenazės 2 inhibitorius.

Atsargiai vartoti ibuprofeną pacientams sergantiems širdies ir kraujagyslių, ir smegenų kraujagyslių susirgimais.

Yra duomenys, kad vaistų slopinanti ciklooksigenazės/prostaglandinų sintezę vartojimas gali mažinti moters vaisingumą dėl poveikio ovuliacijai. Nutraukus vaisto vartojimą vaisingumas atsistato.

Jeigu Jums anksčiau buvo skrandžio ar žarnyno opa, ypač jei ji komplikavosi prakiurimu arba kraujavo, Jūs turite atkreipti dėmesį bet kokius neprastus pilvo simptomus, ypač gydymo pradžioje, ir nedelsdamas pasakyti apie juos gydytojui. Šiuo atveju, ypač senyvo amžiaus pacientams, yra didesnė virškinimo trakto kraujavimo ir prakiurimo rizika. Jei iš virškinimo trakto kraujuoja arba jis prakiurė, vaisto reikia nebevartoti.

Skrandžio ir žarnyno kraujavimas, opėjimas arba prakiurimas gali ištykti be jokios spėjamos priežasties, net jeigu anksčiau tokie problemų nebuvo. Be to, šie simptomai gali būti mirtini.

Senyviems pacientams yra didesnis NVNU sunkaus nepageidaujamo poveikio pavojus.

Skrandžio ir žarnyno kraujavimas, opėjimas arba prakiurimas paprastai būna dažnesnis, vartojant didesnes ibuprofeno dozes. Be to, rizika padidėja, jei kartu su ibuprofenu vartojama kiti vaistai.

Vaisto reikia vartoti atsargiai pacientams, gydomiems vaistais, pvz., geriamaisiais kortikosteroidais, antikoagulantais (varfarinu), selektyviais serotonino reabsorbcijos inhibitoriais ar vaistais, mažinančiais

trombocit agregacij (pvz., acetilsalicilo rūgštimi), kurie gali didinti virškinimo trakto išopėjimo ar kraujavimo riziką.

Pacientams vartojantiems ibuprofeną, jeigu atsiranda virškinimo trakto kraujavimas ar išopėjimas gydymas turi būti nutraukiamas nedelsiant.

Jei atsirast odos bėrimo, gleivinių pažeidimo arba kitoki alergijos požymi, IBUMAX vartojimui reikia nedelsiant užbaigti, nes tai gali būti pirmieji galimai mirtinai sunkios odos reakcijos (eksfoliacinio dermatito, daugiaformės eritemos, Stevens-Johnson'o sindromo, Lyell sindromo) požymiai. Didžiausia ši reakcijų tikimybė yra pirmąjį gydymo mėnesį.

Pacientams, kuriems yra astma, susijusi su lėtiniu rinitu, lėtiniu sinusitu ir /arba nosies polipais vartojantiems acetilsalicilo rūgštį ir/ar NVNU yra rizika alerginėms reakcijoms.

Jeigu atsiranda regos sutrikimai, vaisto vartojimui reikia nutraukti ir rekomenduojama atlikti pilną akių būklės ištyrimą.

Ilgai vartojant ibuprofeną rekomenduojama sekti kraujo lėtelių formulę, inkstų ir kepenų funkcijas rodiklius.

Dehidruotiems vaikams ir paaugliams yra rizika susirgti inkstų funkcijos nepakankamumu.

Kiti vaistai ir IBUMAX

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitą vaistą arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

IBUMAX gali turėti tokias pačias sąveikas kaip kuriems kitiems vaistams arba gali būti jais veikiamas. Pavyzdžiui:

- vaistai, kurie yra antikoagulantai (t. y. kraują skystinantys arba krešėjimą mažinantys, pvz., aspirinas / acetilsalicilo rūgštis, varfarinas, tiklopidinas);
- vaistai, kurie mažina didelį kraujospūdį (AKF inhibitoriai, pvz., kaptoprilis, beta receptorių blokuojantys vaistai, pvz., atenololis, angiotenzino II receptorių blokatoriai, pvz., losartanas).

Kai kurie kiti vaistai gali taip pat turėti tokias pačias sąveikas su IBUMAX arba gali būti jais veikiami. Todėl prieš vartodami IBUMAX su kitais vaistais visada pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

IBUMAX (kaip ir kiti NVNU) reikia vartoti atsargiai kartu su:

Acetilsalicilo rūgštis: kaip ir kitus NVNU, kartu vartoti acetilsalicilo rūgštį ir ibuprofeną nerekomenduojama, dėl didesnės nepageidaujamo poveikio rizikos.

Kraujospūdį mažinantys vaistai: NVNU gali silpninti šių vaistų poveikį.

Diuretikai (šlapimo išsiskyrimą skatinančios tabletės): kartu vartojant mažėja diuretikų diuretinis poveikis ir gali padidėti NVNU toksinis poveikis inkstams.

Širdį veikiantys glikozidai: NVNU gali pasunkinti širdies nepakankamumą ir padidinti glikozidų kiekį kraujyje;

Litis: padidina ličio kiekį kraujyje ir sumažėja ličio pašalinimas iš organizmo.

Metotreksatas: padidina metotreksato kiekį kraujyje ir sumažėja metotreksato pašalinimas iš organizmo.

Mifepristonas: NVNU neturi būti vartojami 8-12 dienų po mifepristono paskyrimo, nes NVNU gali mažinti mifepristono poveikį.

Kiti NVNU, skaitant selektyvius ciklooksigenazės 2 inhibitorius, gali padidinti nepageidaujamo poveikio riziką.

Ciklosporinas: padidina toksinio poveikio inkstams riziką.

Kortikosteroidai: gali padidinti NVNU nepageidaujamo poveikio riziką, ypač virškinimo trakto išopėjimą ar kraujavimą.

Krešėjimą mažinantys vaistai: NVNU gali sustiprinti antikoagulantų (pvz., varfarino) poveikį.

Vaistai, mažinantys trombocitų agregaciją (pvz., acetilsalicilo rūgštis) ir selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai, gali didinti virškinimo trakto kraujavimo riziką.

Chinolonų grupės antimikrobiniai vaistai: pacientai vartojantys NVNU ir chinolonų grupės antimikrobinus vaistus turi didesnį rizikos pavojų atsirasti mėsos šlungiui.

Takrolimai: su takrolimais kartu skiriant NVNU gali padidinti toksinio pavojaus inkstams riziką.

Zidovudinas: kartu skiriant NVNU padidėja hematologinio toksiškumo pavojus.

Aminoglikozidai: NVNU gali sumažinti aminoglikozidų išsiskyrimą iš organizmo.

Augaliniai ekstraktai: Ginkgo biloba gali padidinti NVNU kraujavimo rizikos pavojų.

IBUMAX vartojimas su maistu ir gėrimais

IBUMAX tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalgį, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Vartojant IBUMAX, pastoti gali tapti sunkiau. Jeigu Jūs ketinate pastoti arba Jums nepavyksta pastoti, reikia informuoti gydytoją.

Ibuprofeno pirmuosius šešis nėštumo mėnesius galima vartoti tik gydytojui leidus.

Paskutiniaisiais trimis nėštumo mėnesiais ibuprofeno vartoti draudžiama.

Nors žindyvams pienų preparato patenka labai mažas kiekis, žindymo laikotarpiu ibuprofeno negalima vartoti, jei tai nėra būtina.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

IBUMAX gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia. Tačiau, vartojamas didelėmis dozėmis, jis gali sukelti nepageidaujamą poveikį, tokią kaip nuovargis, mieguistumas, galvos svaigimas ir regos sutrikimai, todėl pavieniais atvejais gali sutrikti gebėjimas vairuoti automobilį ir valdyti mechanizmus. Šis poveikis būna stipresnis, jei kartu vartojama alkoholio.

3. Kaip vartoti IBUMAX

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams

Rekomenduojama dozė yra po 1 pl. veidengtą tabletę 3 kartus per parą. Nereikėtų viršyti didžiausios paros dozės 1200 mg ibuprofeno (3 pl. veidengtas tabletes).

Jei simptomai per tris dienas nepraeina, reikalinga gydytojo konsultacija, dėl tolimesnio IBUMAX 400 mg pl. veidengtos tabletės vartojimo.

Nepageidaujamas poveikis gali sumažėti, vartojant mažiausi veiksming vaisto doz trumpiausi laik , b tin simptom kontrolei.

Senyviems pacientams, taip pat pacientams, kuri inkst ar kepen funkcija sutrikusi
Ši grupi pacientams specialaus dozavimo nereikia, ta iau vaist reikia vartoti atsargiai.
Esant sunkiam inkst arba kepen funkcijos nepakankamumui, vaist vartoti draudžiama.

Tabletes reikia nuryti valgio metu arba pavalgis, užsigeriant pakankamu skys io kiekiu.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

IBUMAX jaunesniems kaip 12 met vaikams vartoti negalima.

Jei 12 met ir vyresniems vaikams šio vaisto reikia vartoti ilgiau nei 3 dienas, arba jei simptomai pasunk ja, b tina kreiptis gydytoj .

K daryti pavartojus per didel IBUMAX doz ?

Jei suvartojote per didel IBUMAX doz arba jei vaikai atsitiktinai suvartojo šio vaisto, visada kreipkit s gydytoj ar artimiausi lignonin , kad jie išreikšt savo nuomon d l galimos rizikos ir patart , koki veiksm reikia imtis.

Gali pasireikšti tokie simptomai, kaip pykinimas, skrandžio skausmai, v mimas (gali b ti šiek tiek kraujo), galvos skausmas, triukšmas ausyse, sumišimas ir nekontroliuojami aki judesiai. Nustatyta, kad suvartojus dideles dozes, pasireiškia mieguistumas, skausmas kr tin s srityje, stiprus ir greitas širdies plakimas, s mon s netekimas, traukuliai (dažniausiai vaikams), silpnumas ir galvos svaigimas, kraujas šlapime, š lan io k no jausmas ir kv pavimo sutrikimai.

minio apsinuodijimo nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo gydymas yra palaikomasis ar simptominis.

Perdozavimas gydomas taip: vaist nurijus, kuo grei iau mažinti rezorbci j – nedelsiant plauti skrand ir duoti aktyvintos anglies.

Perdozavus ibuprofeno, specifinio priešnuodžio n ra.

Pamiršus pavartoti IBUMAX

Negalima vartoti dvigubos doz s norint kompensuoti praleist tablet .

Nustojus vartoti IBUMAX

Jeigu kilt daugiau klausim d l šio vaisto vartojimo, kreipkit s gydytoj arba vaistinink .

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutin poveik , nors jis pasireiškia ne visiems žmon ms.

Tokie vaistai, kaip IBUMAX, gali b ti susij su širdies priepuolio („miokardo infarkto“) ar insulto pavojaus nedideliu padid jimu.

Pranešta apie IBUMAX sukeltas padid jusio jautrumo reakcijas: padid j s kv pavimo tak reaktyvumas, pvz., astma, pasunk jusi astma, bronch spazmas, dusulys; vairios odos reakcijos, pvz., niežulys, dilg lin , angioedema, re iau eksfoliacin s ir p slin s dermatoz s (skaitant epidermio nekroliz ir daugiaform eritem).

Tokie vaistai, kaip IBUMAX, gali b ti susij su širdies priepuolio („miokardo infarkto“) ar insulto pavojaus nedideliu padid jimu.

Toliau išvardijami nepageidaujami poveikiai, susij su trumpalaikiu ibuprofeno vartojimu rekomenduojamomis doz mis. Gydant l tines b kles ilg laik , gali pasireikšti ir kit nepageidaujam reiškini .

Dažni (gali pasireikšti re iau kaip 1 iš 10 žmoni):

galvos skausmas, mieguistumas, galvos svaigimas (vertigo), nuovargis, susijaudinimas, svaigulys, nemiga, dirglumas.

Nedažni (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 žmoni):

rinitas,

pilvo skausmas, dispepsija, pykinimas,

vair su odos išbėrimais,

padidėjusio jautrumo reakcijos, pasireiškiančios dilgeline ir niežuliu.

Reti (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 žmoni):

viduriavimas, vidurių tūtimas, vidurių užkietėjimas ir vėmimas.

Labai reti (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 000 žmoni):

- miokardo infarktas,
- sutrikusi kraujodara, kurios pirmieji požymiai yra karščiavimas, gerklės skausmas, burnos gleivinės opos, gripo panašūs simptomai, sunkus išsekimas, kraujavimas iš nosies ir odos,
- aseptinis meningitas,
- regėjimo sutrikimai,
- žesys ausyse ir svaigulys,
- astma, bronchospazmas, dusulys ir kvėpavimo pasunkėjimas,
- pepsinopa; virškinimo trakto prakiurimas ar kraujavimas iš jo, išmatose kraujas, vėmimas krauju, kartais nulemiantys mirtį, ypač senyviems pacientams; paimtinis opinis kolitas ir Krono liga,
- sumažėjęs šlapimo kiekis ir edema, minis inkstų nepakankamumas, inkstų spenelių nekrozė (ypač vartojant ilgą laiką), padidėjusi šlapalo koncentracija serume,
- sunkios odos reakcijos, skaitant eksfoliacinį dermatitą, Stivenso ir Džonsono sindromą bei toksinį epidermio nekrolizą,
- padidėjusį kraujospūdį,
- edema (paburkimas), periferinis edema,
- autoimuninis ligonis sergantiems ligoniams, pvz., sisteminė raudonoji vilklige arba mišria jungiamojo audinio liga, buvo pastebėta meningito atvejais (tai pasireiškia kaklo sustingimu, galvos skausmu, pykinimu, vėmimu, karščiavimu ir orientacijos praradimu). Sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos, kurių simptomai gali būti: veido, liežuvio ir gerklės paburkimas, dusulys, greitas širdies plakimas, sumažėjusį kraujospūdį; paimtinis astma ir bronchospazmas,
- sutrikusi kepenų veikla, ypač vartojant ilgą laiką. Kepenų pakenkimai, ypatingai ilgai trunkančio gydymo metu, hepatitas ir gelta,
- nervingumas,
- sumažėjusį hematokritą ir hemoglobino kiekį.

Nežinomas (dažnis negali būti vertintas pagal turimus duomenis):

gali pasireikšti stipri odos reakcija, vadinama DRESS sindromu. DRESS simptomai gali būti tokie: odos išbėrimas, karščiavimas, padidėjusi limfmazgiai ir padidėjusis eozinofilų (baltųjų kraujo kūnelių) skaičius.

Lytinės sistemos ir kraujotakos sutrikimai

Yra duomenys, kad vaistiniai preparatai, slopinantys ciklooksigenazės arba prostaglandinų sintezę, gali veikti ovuliaciją ir dėl to sutrikdyti moters vaisingumą. Nutraukus vaistinio preparato vartojimą, toks poveikis praeina.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, skaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainė (adresu <http://www.vvkt.lt>). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti IBUMAX

Šis vaistas laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Šiam vaistui specialūs laikymo sąlygos nereikia.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ ir lizdinis plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinio nurodyto mėnesio dienos.

Vaistas negalima išmesti kanalizacijai arba su buitiniams atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

IBUMAX sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra ibuprofenas. Vienoje tabletėje yra 400 mg ibuprofeno.
- Pagalbinės medžiagos. *Tabletės branduolys*: pregelifikuotas krakmolas, hipromeliozė, mikrokristalinė celiuliozė, magnio stearatas, stearino rūgštis, bevandenis koloidinis silicio dioksidas, natrio laurilsulfatas. *Tabletės plėvelė*: Opadry Oy-S-28703 (makrogolis 4000, hipromeliozė, titano dioksidas (E 171), polidekstrozė).

IBUMAX išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tabletės yra baltos, kapsulės formos, 7,5 mm pločio ir 18 mm ilgio su vagele.

Vagelė skirta tik tabletei perlaužti, kad būtų lengviau nuryti, bet ne jai padalyti lygias dozes.

IBUMAX tiekiamas lizdinėmis plokštelėmis po 10 tablečių. Kartono dėžutėje yra 10 tablečių ir pakuotės lapelis.

Registruotojas ir gamintojas

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hameenlinna
Suomija
Tel. + 358 3 615 600
Faks. + 358 3 618 3130

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės vietinį registruotojo atstovą.

UAB Vitabalans
Užupio g. 30
01203 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 6161 5750

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2018-05-10

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.