

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Enalapril Vitabalans 5 mg tabletės
Enalapril Vitabalans 10 mg tabletės
Enalapril Vitabalans 20 mg tabletės
Enalaprilio maleatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėliau gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės gydytojų arba vaistininkų.
- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės gydytojų arba vaistininkų. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Enalapril Vitabalans ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Enalapril Vitabalans
3. Kaip vartoti Enalapril Vitabalans
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Enalapril Vitabalans
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Enalapril Vitabalans ir kam jis vartojamas

Enalapril Vitabalans priklauso vaistams, vadinami angiotenziną konvertuojančiu fermento (AKF) inhibitoriais, grupei. Šie vaistai plečia kraujagysles, todėl širdis lengviau jomis pumpuoja kraują visose kūno vietose, bei tokiu būdu sumažėja padidėjusių kraujospūdžių.

Enalapril Vitabalans vartojamas:

- didelio kraujospūdžio ligai (arterinei hipertenzijai) gydyti;
- simptominiam širdies nepakankamumui (būklei, kai širdis nepajėgia išstumti tiek kraujo, kiek jo reikia organams aprūpinti) gydyti;
- simptominio širdies nepakankamumo profilaktikai, kai simptomai dar nepasireiškia, tačiau širdies išstipimo funkcija yra sutrikusi.

2. Kas žinotina prieš vartojant Enalapril Vitabalans

Enalapril Vitabalans vartoti negalima:

- jeigu yra alergija veikliajai medžiagai enalaprilio maleatui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje) arba bet kuriam kitam AKF inhibitoriui;
- jeigu ankstesnio gydymo AKF inhibitoriais metu atsirado alerginė reakcija, vadinama angioneurozine edema, sukelianti rankų, kulnų, veido, lūpų, liežuvio arba gerklų patinimą bei rijimo arba kvėpavimo pasunkėjimą;
- jei yra paveldimas arba savaiminis, t. y. nežinomo priežasties sukeltas, audinių patinimas (angioneurozinė edema);
- paskutiniuosius šešis mėnesius (taip pat Enalapril Vitabalans reikėtų vengti pirmus tris mėnesius – žr. skyrių "Nėštumas");
- jeigu Jūs sergate cukriniu diabetu arba Jūsų inkstai veikia sutrikusi ir Jums skirtas kraujospūdį mažinantis vaistas, kurio sudėtyje yra aliskireno.

spėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Enalapril Vitabalans

- jei Jūs ilgai ir sunkiai viduriavote arba vėmėte;
- jei vartojate šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus, pvz., diuretikus;
- jei Jūs maiste labai ribojamas druskos kiekis;
- jei sergate kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis, pvz., koronarine širdies liga (kratinės angina) arba širdies raumens liga, vadinama kardiomiopatija, yra sutrikusi smegenų kraujotaka, pažeisti širdies vožtuvai, susiaurėjusi aorta;
- jei yra inkstų funkcijos sutrikimas, taikoma hemodializė arba yra persodintas inkstas;
- jei yra susiaurėjusios inkstų arterijos ir dėl to pasireiškė didelis kraujospūdis;
- jei sutrikusi kepenų funkcija;
- jei sergate tam tikra jungiamojo audinio liga (kolagenoze), kuri apima ir kraujagysles, pvz., Reino (*Raynaud*) sindromas arba sklerodermija;
- jei anksčiau pavartojus AKF inhibitorius, prasidėjo sausas nepaliojamas kosulys (žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“);
- jei Jums reikalinga desensibilizacija, galus vabzdžiams (pvz., bitėms ar vapsvoms);
- jei Jums taikoma MTL aferezė (naudojant rangą, valomas kraujas nuo per didelio cholesterolio kiekio);
- jei sergate cukriniu diabetu (žr. 2 skyriuje „Kiti vaistai ir Enalapril Vitabalans“);
- jei sergate jungiamojo audinio liga (kolagenoze), vartojate imuninę sistemą slopinančius preparatus (autoimuninėms ligoms gydyti, pvz., reumatoidiniam artritui arba po transplantacijos operacijos), vartojate alopurinolio (podagrai gydyti) arba vartojate prokainamido (vaisto širdies ritmo sutrikimams gydyti);
- jei vartojate kalio druskų papildus arba druskų pakaitalus, kuriuose sudėtyje yra kalio;
- jei vartojate ličio preparatus (vartojami kai kurioms psichinėms ligoms gydyti);
- jei priklausote etninei grupei, kurios atstovams kraujospūdis šis vaistas mažina nepakankamai (juodaodžiai pacientai);
- jeigu vartojate kur nors iš šių vaistų padidėjusiam kraujospūdžiui gydyti:
 - angiotenzino II receptorių blokatoriai (ARB) (vadinami valsartan, pavyzdžiui, valsartan, telmisartan, irbesartan), ypač jei turite su diabetu susijusį inkstų sutrikimą.
 - aliskiren

Jūs gydytojas gali reguliariai iširti Jūsų inkstų funkciją, kraujospūdį ir elektrolitų kiekį (pvz., kalio) kraujyje.

Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą poskyryje „Enalapril Vitabalans vartoti negalima“.

Pasakykite nedelsdami savo gydytojui, jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu atsiranda bet koks iš toliau nurodytų simptomų:

- jau po pirmos dozės pasireiškia svaigulys. Kai kurie žmonės reaguoja pirmą vaisto dozę arba dozės padidinus atsiranda svaigimas, silpnumas, alpimas ir šleikštulys;
- staigus veido, lūpų, liežuvio, tikrojo balso aparato, gerklų, kaklo bei rankų ir pėdų patinimas, arba dusulys ar užkimimas. Šis būklė vadinama angioneurozine edema. Ji gali pasireikšti bet kokiame vaisto vartojimo periodu. AKF inhibitoriais gydomiems juodaodžiams pacientams angioneurozinė edema pasireiškia dažniau nei nejuodaodžiams;
- karščiavimas, gerklų skausmas arba burnos gleivinės išopėjimas (tai yra infekcinės ligos, pasireiškusių dėl sumažėjusio baltųjų kraujo ląstelių skaičiaus, simptomai);
- odos ir akių pageltimas (gelta), tai gali būti kepenų ligos požymiai.

Prieš pradėdami vartoti Enalapril Vitabalans, pasakykite gydytojui, jei bet kuri minėta situacija jus neramina arba yra su Jumis susijusi.

Jei Jums planuojama atlikti operaciją arba operuoti, taikant bendrąją arba spinalinę anesteziją, pasakykite anesteziologui, kad vartojate Enalapril Vitabalans tabletes.

Jei manote, kad esate nė šia arba planuojate pastoti, būtinai apie tai pasakykite gydytojui. Ankstyvuojanti nėštumo laikotarpiu Enalapril Vitabalans vartoti nerekomenduojama, o po trijų nėštumo mėnesių vartoti negalima, nes galimas sunkus vaisiaus pažeidimas (žr. skyri „Nėštumas“).

Kiti vaistai ir Enalapril Vitabalans

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitą vaistą, arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Jeis gydytojas turi žinoti, jei vartojate vaistą, ypač toliau išvardytą:

-) diuretikai;
-) kalciumo antagonistai, pvz., amilorido, spironolaktono arba triamtereno;
-) kalio papildai, pvz., kalio tabletes arba kalio tirpalai;
-) kitoki vaistai nuo padidėjusio kraujospūdžio;
-) kitoki vaistiniai preparatai, kurie gali mažinti kraujospūdį, pvz., nitratai, vartojami koronarinei širdies ligai gydyti, tricikliniai antidepresantai (fenotiazino dariniai), vartojami psichikos ligai gydyti arba barbituratai, vartojami epilepsijai gydyti, migdomieji ar anestetikai;
-) litio (vaisto, vartojamo maniakinei depresijai gydyti);
-) vaistiniai preparatai nuo cukrinio diabeto (arba insulino, arba geriamieji antidiabetiniai preparatai). Gali prireikti mažinti dozes;
-) alopurinolio (vaisto nuo podagros) arba prokainamido (vaisto nuo širdies ritmo sutrikimo);
-) vaistiniai preparatai, slopinantys imuninę sistemą, pvz., po organ persodinimo;
-) nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), pvz., jei reguliariai arba ilgą laiką vartojama acetilsalicilo rūgštis, ibuprofeno arba ketoprofeno. Nustatyta, kad mažos acetilsalicilo rūgštis paros dozės (50 arba 100 mg) vartojamos kraujo krešėjimo profilaktikai, vartoti kartu su Enalapril Vitabalans yra saugu;
-) simpatikomimetikai (vaistai, sukeliantys kraujospūdžio padidėjimą);
-) aukso preparatai. Pacientams, vartojantiems aukso preparatus, gali pasireikšti veido paraudimas, pykinimas, vėmimas ir kraujospūdžio sumažėjimas.

Jeis gydytojui gali tekti pakeisti vaisto dozę ir (arba) imtis kitų atsargumo priemonių: jeigu vartojate angiotenzino II receptorių blokatorių (ARB) arba aliskireną (taip pat žiūrėti informaciją, pateiktą poskyriuose „Enalapril Vitabalans vartoti negalima“ ir „spėjimai ir atsargumo priemonės“).

Enalapril Vitabalans vartojimas su maistu ir gėrimais

Maistas ir gėrimai neturi tokios Enalapril Vitabalans absorbcijai. Tabletę galima išgerti nevalgius arba valgio metu, užsigeriant pakankamu kiekiu (pvz., stikline) vandens.

Jei vartojama daug druskos (natrio chlorido), Enalapril Vitabalans poveikis silpnėja.

Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu vartoti druskos pakaitalą arba maisto papildą, kuriuose yra kalio, nerekomenduojama, kadangi kraujyje gali labai padidėti kalio koncentracija.

Alkoholis gali stiprinti Enalapril Vitabalans poveikį kraujospūdžiui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Jeigu esate nė šia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nė šia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Gydytojas patars nutraukti Enalapril Vitabalans vartojimą, jei planuojate nėštumą, jei esate nė šia arba Jums patars Enalapril Vitabalans pakeisti kitu vaistu, kadangi ankstyvuojanti nėštumo laikotarpiu Enalapril Vitabalans vartoti nerekomenduojama. Jei vaisto vartojama po trijų nėštumo mėnesių, galimas sunkus vaisiaus pažeidimas kūdikiui.

Žindymo laikotarpis

Jei maitinate krūtimi ar planuojate tai daryti, apie tai pasakykite savo gydytojui. Vartojant Enalapril Vitabalans, pirmas kelias savaites po gimdymo yra nerekomenduojama maitinti krūtimi, ypač jei kūdikis gimė anksčiau laiko.

Vilniaus gydytojas turėtų patarti dėl Enalapril Vitabalans vartojimo privalumų ir trūkumų, maitinimo krūtimi metu, lyginant su kitais gydymo būdais.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Vairuojant automobilį ar dirbant su mechanizmais reikia atkreipti dėmesį tai, kad retkarčiais gali pasireikšti svaigulys arba nuovargis.

Enalapril Vitabalans sukelia šalutinį poveikį, susijusį su kraujospūdžio kritimu, pvz., svaigulys, alpimas arba kai kuriems pacientams miglotumas matym (žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“). Tai ypač būdinga vaisto vartojimo pradžioje arba padidinus dozę. Tokio poveikio galimybė mažesnė, jei yra gera vaisto vartojimo kontrolė. Jei pasireiškia tokie simptomai, reikia atsisakyti vairavimo ir kitos dėmesio reikalaujančios veiklos.

3. Kaip vartoti Enalapril Vitabalans

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės gydytoją arba vaistininką.

Tabletę galima išgerti nevalgius arba valgio metu, užsigeriant pakankamu kiekiu (pvz., stikline) vandens.

Suaugę žmonės

Didelio kraujospūdžio liga

Paprastai pradinė Enalapril Vitabalans paros dozė yra nuo 5 mg iki ne didesnė, kaip 20 mg, prastin palaikomoji paros dozė – 20 mg.

Širdies nepakankamumo gydymas

Pradinė dozė yra 2,5 mg per parą. Gydytojas palaipsniui ją didins tol, kol bus pasiekta tinkama dozė. Paprastai palaikomoji paros dozė yra 20 mg. Ją galima išgerti iš karto arba per du kartus.

Senyvi pacientai ir pacientai sergantys inkstų nepakankamumu

Gydytojas nustato tinkamą dozę, atsižvelgdamas į paciento inkstų funkcijos pajėgumą.

Vartojimas vaikams

Gydytojas nustato tinkamą dozę, atsižvelgdamas į paciento svorį.

Jei manote, kad Enalapril Vitabalans poveikis yra per stiprus arba per silpnas, kreipkitės gydytoją arba vaistininką.

Ką daryti pavartojus per didelę Enalapril Vitabalans dozę

Jeigu pavartojote per didelę medikamento dozę, nedelsiant kreipkitės savo gydytoją, skubios pagalbos skyrių arba artimiausią ligoninę. Dažniausi perdozavimo simptomai ir požymiai yra staigus kraujo spaudimo kritimas ir stuporas (būseną, kai ligonis tampa visiškai nejudrus ir nekalbus, bet sąmonė išlieka). Kiti simptomai: dėl staigus kraujospūdžio sumažėjimo atsiradęs svaigulys arba apsvaigimas, stiprus ir greitas širdies plakimas, greitas pulsas, nerimas, kosulys, inkstų nepakankamumas, ir dažnas kvėpavimas.

Pamiršus pavartoti Enalapril Vitabalans

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Kitą tabletę reikia išgerti atėjus prastam vaisto vartojimo laikui.

Nustojus vartoti Enalapril Vitabalans

Nustojus vartoti medikamento, kraujospaudimas gali padidėti. Jei kraujospaudimas bus per didelis, galimas širdies ir inkstų funkcijos sutrikimas. Vaisto vartojimo nutraukti negalima, nebent Jūsų gydytojas nurodys tai padaryti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės gydytojų arba vaistininkų.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Šalutinio poveikio požymiai nurodyti toliau.

Šalutinio poveikio dažnio apibūdinimas.

Labai dažni: pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 pacientų.

Dažni: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 10 pacientų, bet dažniau kaip 1 iš 100 pacientų.

Nedažni: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 100 pacientų, bet dažniau kaip 1 iš 1000 pacientų.

Reti: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 1000 pacientų, bet dažniau kaip 1 iš 10000 pacientų.

Labai reti: pasireiškia rečiau kaip 1 iš 10000 pacientų, dažnis nežinomas (negali būti vertintas pagal turimus duomenis).

Labai dažni (pasireiškia dažniau kaip 1 iš 10 pacientų)

-) Miglotas matymas;
-) svaigimas, silpnumas;
-) sausas kosulys (jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu atsiranda nuolatinis kosulys, kreipkitės gydytojų);
-) pykinimas.

Dažni (pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 100 pacientų)

-) Galvos skausmas, depresija, nuovargis;
-) staigus kraujospūdžio sumažėjimas, keičiantis kraujospūdžiui, t. y. atsistojant iš gulimos padėties (pasireiškia svaigulys arba alpulys);
-) krūtinės skausmas, širdies ritmo sutrikimas, greitas širdies plakimas (tachikardija);
-) dusulys;
-) viduriavimas, pilvo skausmas, skonio pokyčiai;
-) išbėrimas arba kitokios alerginės reakcijos (žr. toliau „Angioneurozinė edema“);
-) kraujo serume padidėjęs kalio bei kreatinino koncentracija.

Nedažni (pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 1000 pacientų)

-) Anemija;
-) Cukriniu diabetu sergančių žmonių kraujyje per daug sumažėjusi cukraus koncentracija (hipoglikemija);
-) sumišimas, nervingumas, pojūčių sutrikimas, pvz., jaučiamas odos tirpimas, dilgėjimas (parestezija), galvos sukimasis, mieguistumas, nemiga;
-) stipraus širdies plakimo pojūtis (palpitacija);
-) sloga (rinitas), gerklės skausmas, užkimimas, kvėpavimo takų susiaurėjimas;
-) spengimas ausyse;
-) burnos sausumas, vėmimas, rėmuo, skrandžio dirginimas, vidurių užkietėjimas, svorio kritimas;
-) skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa, žarnų nepraeinamumas arba kasos uždegimas (pankreatitas), kurie pasireiškia pilvo skausmu;
-) gausus prakaitavimas, niežulys, dilgėlinė, plaukų slinkimas, odos paraudimas;

-) inkst funkcijos sutrikimas, šlapime atsiranda baltymo;
-) impotencija;
-) raumen spazmai, bloga savijauta, karš iavimas (žr. toliau „D l neaiški priežas i prasid j s karš iavimas“).

Reti (pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 10000 pacient)

-) balt j kraujo l steli kiekio kraujyje sumaž jimas (žr. toliau „D l neaiški priežas i prasid j s karš iavimas“);
-) kraujo plokšteli kiekio sumaž jimas (d l to atsiranda kraujavimas iš nosies arba m lyni atsiradimo tendencija);
-) limfmazgi padid jimas, staigus autoimunin s ligos atsiradimas;
-) nenormal s sapnai, miego sutrikimas;
-) Reino (*Raynaud*) sindromo pasunk jimas (atsiranda rank ir koj piršt skausmas, pirmiausiai j oda tampa blyški, po to melsva ir galiausiai rausva);
-) infiltratai plau iuose, alerginis alveolitas, eozinofilin pneumonija;
-) stomatitas (burnos gleivin s uždegimas), burnos gleivin s aft išop jimas, liežuvio uždegimas;
-) kepen funkcijos sutrikimas, hepatitas, tulžies tak obstrukcija (nepraeinamumas) su gelta (pagelsta oda ir aki baltymas);
-) sunki odos ir gleivini reakcija (daugiaform eritema, Stivenso-Džonsono (*Stevens-Johnson*) sindromas, toksin epidermio nekroliz , p slin , eritrodermija);
-) karš iavimas, raumen arba kraujagysli membran uždegimas raumen ir s nari skausmas (žr. toliau „D l neaiški priežas i prasid j s karš iavimas“)
-) sumaž j s šlapimo kiekis;
-) vyrams padid ja kr tys;
-) padid ja kepen ferment arba serumo bilirubino aktyvumas.

Labai reti (pasireiškia mažiau nei 1 vartotojui iš 10 000)

-) žarn sienel s patinimas (žarn angioedema)

Dažnis nežinomas (negali b ti vertintas pagal turimus duomenis)

-) netinkamos antidiurezinio hormono sekrecijos sindromas (ang. SIADH)

Angioneurozin edema

Jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu atsirado rank , p d , veido, liežuvio arba gerkl patinimas, galintis sukelti dusul arba apsunkinti rijim , J s nedelsiant turite kreiptis gydytoj .

D l neaiški priežas i prasid j s karš iavimas

Jei Enalapril Vitabalans vartojimo laikotarpiu d l neaiški priežas i prasid jo karš iavimas ir kartu pasireišk grip panaš s simptomai (pvz., gerkl s skausmas), kreipkit s gydytoj .

Pranešimas apie šalutin poveik

Jei pasireišk šalutinis poveikis, skaitant šiame lapelyje nenurodyt pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutin poveik taip pat galite pranešti Valstybinei vaist kontrol s tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetain je www.vvkt.lt esan i form ir pateikti j Valstybinei vaist kontrol s tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš ši b d : raštu (adresu Žirm n g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybin s vaist kontrol s tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetain (adresu <http://www.vvkt.lt>). Pranešdami apie šalutin poveik galite mums pad ti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugum .

5. Kaip laikyti Enalapril Vitabalans

Šis vaistas laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Ant dėžutės ir lizdinis plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodytos mėnesio dienos.

Vaistas negalima išmesti kanalizacijai arba su buitiniams atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Enalapril Vitabalans sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra enalaprilio maleatas. Vienoje tabletėje yra 5 mg, 10 mg arba 20 mg enalaprilio maleato.
- Pagalbinės medžiagos yra pregelifikuotas krakmolos, kalcio-vandenilio fosfatas dihidratas, talkas, magnio stearatas, mikrokristalinis celiuliozės, povidonas, natrio-vandenilio karbonatas.

Enalapril Vitabalans 10 mg. Šiose tabletėse yra pagalbinės dažo medžiagos - raudonojo geležies oksido (E172).

Enalapril Vitabalans 20 mg. Šiose tabletėse yra pagalbinis dažo medžiaga - raudonojo geležies oksido (E172) ir geltonojo geležies oksido (E172).

Enalapril Vitabalans išvaizda ir kiekis pakuotėje

Enalapril Vitabalans išvaizda:

Enalapril Vitabalans 5 mg tabletės. Tabletės yra 8 mm skersmens, baltos, apvalios, plokščios, vienoje pusėje yra vagelė, skirta tabletei perlaužti.

Enalapril Vitabalans 10 mg tabletės. Tabletės yra 8 mm skersmens, rausvai rudos, apvalios, plokščios, vienoje pusėje yra vagelė, skirta tabletei perlaužti.

Enalapril Vitabalans 20 mg tabletės. Tabletės yra 8 mm skersmens, šviesiai oranžinės, apvalios, plokščios, vienoje pusėje yra vagelė, skirta tabletei perlaužti.

Tabletės galima padalyti lygias dozes.

Pakuotės dydžiai:

28, 30, 56, 60, 98 arba 100 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Registruotojas
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
Suomija
Tel. + 358 (3) 615 600

Faksas: + 358 (3) 6183 130

Gamintojas
Vitabalans Oy
Varastokatu 7-9
13500 Hämeenlinna
Suomija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės vietinį registruotojo atstovą.

UAB Vitabalans
Savanorių pr. 292 B
49454 Kaunas
Tel. 8-37 714 392

Šis vaistas EEE valstybėse narėse registruotas tokiais pavadinimais: Enalapril Vitabalans (Suomija, Ispanija, Vokietija, Lenkija, Švedija, Slovėnija, Slovakija, Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija).

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2018-09-19.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>