

GYNOLACTA

Tabletki dopochwowe

CO TO JEST WYRÓB MEDYCZNY GYNOLACTA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki dopochwowe GYNOLACTA zawierają substancję czynną kwas mlekowy. Poziom pH w pochwie, czyli poziom kwasowości, wynosi zwykle od 3,8 do 4,5. Kwasowość w pochwie regulują bakterie kwasu mlekowego, które wytwarzają kwas mlekowy. Kwaśne środowisko hamuje zbyt szybki wzrost bakterii bytujących w pochwie a tym samym zapobiega wzrostowi bakterii chorobotwórczych. Wszelkie zmiany kwasowości powodują nieprzyjemne w zapachu upławy.

Zaburzenia równowagi bakteryjnej w pochwie (bakteryjne zapalenie pochwy)

Kwasowość pochwy obniża się w miarę zmniejszania się ilości bakterii kwasu mlekowego, co prowadzi do utraty równowagi bakteryjnej. Brak równowagi bakteryjnej i związane z tym objawy są zjawiskiem często występującym u kobiet. Przyczyną bakteryjnego zapalenia pochwy jest m.in. kuracja antybiotykowa, krwawienia miesiączkowe, ciąża, współżycie, menopauza i przesadna higiena intymna. Najczęstsze objawy bakteryjnego zapalenia pochwy to nadmierne upławy w kolorze mlecznym lub szarym, którym zwykle towarzyszy nieprzyjemny zapach. Ponadto może wystąpić nieznaczne swędzenie i pieczenie. Na ogół nie pojawia się stan zapalny.

Wyrób medyczny GYNOLACTA jest stosowany w leczeniu i profilaktyce bakteryjnego zapalenia pochwy w celu przywrócenia i utrzymania naturalnej kwasowości pochwy.

SKŁAD WYROBU MEDYCZNEGO GYNOLACTA

Każda tabletka dopochwowa zawiera 50 mg kwasu mlekowego. Pozostałe składniki to mleczan wapnia, laktoza, hydroksypropylometyloceluloza, talk i stearynian magnezu. Preparat jest bezzapachowy i nie zawiera barwników.

JAK STOSOWAĆ WYRÓB MEDYCZNY GYNOLACTA

Instrukcje dotyczące sposobu użycia i dawkowania w przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy:

Za pomocą palców umieścić 1 tabletkę dopochwową głęboko w pochwie, stosować na noc przed pójściem spać przez 7 kolejnych dni.

Instrukcje dotyczące sposobu użycia i dawkowania w profilaktyce bakteryjnego zapalenia pochwy:

Za pomocą palców umieścić 1 tabletkę dopochwową głęboko w pochwie, stosować na noc przed pójściem spać przez 3 kolejne dni.

W razie potrzeby można przedłużyć okres leczenia i powtórzyć kurację.

Przed zastosowaniem preparatu należy starannie umyć ręce.

Należy skontaktować się z lekarzem,

- jeśli objawy nasila się w czasie leczenia;
- jeśli objawy nie ulegną poprawie po 7 dniach kuracji.

Jeżeli powyższe objawy występują należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Wyrób medyczny GYNOLACTA może być stosowany podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

KIEDY NIE STOSOWAĆ WYROBU MEDYCZNEGO GYNOLACTA

- w przypadku silnego swędzenia lub bólu w pochwie;
- w przypadku płamienia.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych.

PRZECHOWYWANIE WYROBU MEDYCZNEGO GYNOLACTA

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Wielkość opakowania:

Opakowanie zawiera 8 tabletek dopochwowych

Wytwórca i dystrybutor

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FI-13500, Hämeenlinna, Finlandia
Tel. +358 3 615 600



Spełnia wymagania
dyrektywy 93/42/EWG.



Termin ważności



Wytwórca i dystrybutor



Numer partii

Vitabalans oy

2429/1