

PAKKAUSSELOSTE

GYNOLACTA

emätintabletti

MIKÄ GYNOLACTA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

GYNOLACTA on emätintabletti, joka sisältää vaikuttavana aineena maitohappoa. Normaalisti emättimen happamuutta kuvaava pH-arvo on 3,8 - 4,5 välillä. Happamuutta säätelevät emättimen bakteerikasvuston maitohappobakteerit, jotka tuottavat maitohappoa. Hapan ympäristö hillitsee emättimen muiden bakteereiden liikakasvua ja estää myös taudinaiheuttajabakteereiden kasvua. Happamuuden muutos aiheuttaa epätavallista ja pahanhajuista vuotoa.

Emättimen bakteeritasapainon häiriö (bakteerivaginoosi)

Emättimen happamuus vähenee, kun maitohappobakteerimäärä laskee, mikä johtaa bakteeritasapainon häiriöön. Bakteeritasapainon häiriö ja siitä johtuvat oireet ovat naisilla yleisiä. Bakteerivaginoosiin altistavat muun muassa antibioottihoito, kuukautisvuoto, raskaus, yhdyntä, vaihdevuodet ja liiallinen intiimihygienia. Tavallisin oire on normaalia runsaampi valkovuoto, joka on maitomaista ja harmahtavaa, ja jossa on tyyppillinen epämiellyttävä haju. Lisäksi saattaa esiintyä lievää kutinaa ja kirvelyä. Häiriöön ei yleensä liity tulehdusta.

GYNOLACTAA käytetään bakteerivaginoosissa ja sen ennaltaehkäisyssä palauttamaan ja ylläpitämään emättimen luontaista happamuutta.

GYNOLACTAN KOOSTUMUS

Emätintabletti sisältää maitohappoa 50 mg. Muita aineita ovat kalsiumlaktatti, laktoosi, hydroksipropyylimetyyliseluloosa, talkki ja magnesiumstearaatti. Valmiste on hajusteeton ja väriaineeton.

MITEN GYNOLACTAA KÄYTETÄÄN

Käyttöohje ja annostus bakteerivaginoosissa:

Aseta 1 emätintabletti sormin syvälle emättimeen iltaisin ennen nukkumaan menoa 7 päivän ajan.

Käyttöohje ja annostus bakteerivaginoosin ennaltaehkäisyssä:

Aseta 1 emätintabletti sormin syvälle emättimeen iltaisin ennen nukkumaanmenoa 3 päivän ajan.

Tarvittaessa hoitoa voi pidentää ja hoitokuurin voi toistaa.

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta valmisteen annostelun aikana.

Ota yhteys lääkäriin,

- jos oireesi pahenevat kuurin aikana.

- jos oireesi jatkuvat vielä 7 päivän kuurin jälkeen.

Raskaus ja imetys

GYNOLACTAA voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

ÄLÄ KÄYTÄ GYNOLACTAA

- jos emättimessä on voimakasta kutinaa tai kipua.

- jos vuoto on verensekaista. Hakeudu tällöin lääkärin hoitoon.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Ei tunnettuja haittavaikutuksia.

GYNOLACTAN SÄILYTTÄMINEN

Säily huoneenlämmössä alle 25 °C. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pakkausko: 8 emätintablettia läpipainopakkauksessa

Valmistaja ja markkinoija

Vitabalans Oy, Varastokatu 8
FI-13500, Hämeenlinna, Finland
Tel. +358 3 615 600



Direktiivin 93/42/EEC mukainen



Eränumero



Valmistaja ja markkinoija



Käytettävä viimeistään

BIPACKSEDEL
GYNOLACTA
vaginaltablett

VAD GYNOLACTA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

GYNOLACTA är en vaginaltablett som innehåller mjölksyra som aktiv substans. Normalt ligger pH-värdet som beskriver surhetsgraden i vaginan mellan 3,8 - 4,5. Surheten regleras av mjölksyrebakterierna i vaginas bakterieflora som producerar mjölksyra. Den sura omgivningen dämpar överdriven tillväxt av andra bakterier i vaginan samt förhindrar tillväxten av sjukdomsframkallande bakterier. Förändring av surhetsgraden orsakar onormal och illaluktande flytningar.

Rubbning av bakteriefloran i slidan (bakteriell vaginos)

Surhetsgraden i slidan minskar när antalet mjölksyrebakterier minskar, vilket leder till obalans i bakteriefloran. Rubbningar i bakteriefloran samt symptom som orsakas av detta är vanliga hos kvinnor. Faktorer som utsätter för bakteriell vaginos omfattar bl.a. behandling med antibiotika, menstruationsblödning, graviditet, samlag, övergångsålder och överdriven intimhygien. Vanligaste symtom är mjölkaktiga, grådaskiga flytningar som är rikligare än normalt och som har en typisk, obehaglig lukt. Därtill kan lindrig klåda och sveda också förekomma. Rubbningen är vanligen inte associerad med infektion.

GYNOLACTA används vid behandling och förebyggande av bakteriell vaginos för att återställa och upprätthålla den naturliga surheten i vaginan.

SAMMANSÄTTNING

Vaginaltablett innehåller mjölksyra 50 mg. Övriga innehållsämnen är kalciumlaktat, laktos, hydroxiopropylmetylcellulosa, talk och magnesiumstearat. Preparatet är oparfymrat och utan färgämnen.

HUR DU ANVÄNDER GYNOLACTA

Bruksanvisning och dosering vid bakteriell vaginos:

Applicera 1 vaginaltablett djupt in i vaginan med fingrarna vid sänggåendet under 7 dagar.

Bruksanvisning och dosering för att förebygga bakteriell vaginos:

Applicera 1 vaginaltablett djupt in i slidan med fingrarna vid sänggåendet under 3 dagar

Vid behov kan behandlingen förlängas och behandlingsskuren upprepas.

Sörj för god handhygien när du applicerar preparatet.

Kontakta läkare

- om dina symtom förvärras under kuren.
- om dina symtom fortsätter ännu efter 7-dagarskuren.

Graviditet och amning

GYNOLACTA kan användas under graviditet och amning.

ANVÄND INTE GYNOLACTA

- om du har stark klåda eller smärta i vaginan.
- om flytningar är blandade med blod. Uppsök i så fall läkarvård.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Inga kända biverkningar.

HUR GYNOLACTA SKA FÖRVARAS

Förvaras i rumstemperatur under 25 °C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förpackningsstorlek: 8 vaginaltabletter i blisterförpackning

Tillverkare och marknadsförare

Vitalans Oy, Varastokatu 8
FI-13500, Hämeenlinna, Finland
Tel. +358 3 615 600



Enligt direktiv
93/42/EEC

0537



Tillverknings-
satsnummer



Tillverkare och
marknadsförare



Utgångsdatum

Vitalans oy

2444/2